

一週國際疫情 111/07/04-111/07/10

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
腸病毒	越南	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	東南亞、亞洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
麻疹	斐濟、非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
霍亂	南亞、非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
A 型肝炎	黎巴嫩	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等	■ 手部衛生

炭疽病	全球	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
白喉	全球	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜(pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性(self-limited)腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染(以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	■ 手部衛生
恙蟲病	南亞	症狀包括發燒、惡寒、頭痛、背痛及肌肉痛、淋巴結腫大、出疹等，通常在恙蟎叮咬的部位，會形成特有的洞穿式皮膚潰瘍型焦痂	■ 手部衛生
傷寒	剛果民主共和國	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅腫、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
流行性腦脊髓膜炎	美國	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂(譫妄)	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
發熱伴血小板減少綜合症(SFTS)	日本、中國	發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常	■ 手部衛生