

一週國際疫情 111/08/08-111/08/14

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
登革熱	亞洲、東南亞	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
腸病毒	泰國/韓國	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
兒童急性嚴重不明原因肝炎	全球	16 歲以下且具急性肝炎症狀 (如黃疸、茶色尿、疲倦、腹痛、胃口差、噁心、嘔吐)、AST 或 ALT >500 IU/L	■ 手部衛生
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩

西尼羅熱	歐洲	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■ 手部衛生
流行性腦脊髓膜炎	澳洲	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
白喉	瑞士/留尼旺	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜（pseudomembrane），並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
日本腦炎	印度	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）	■ 手部衛生
瘧疾	香港	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
漢他病毒症候群	南美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
霍亂	亞洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
傷寒	剛果民主共和國	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	阿富汗、西班牙	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

德國麻疹	玻利維亞	輕微發燒、全身倦怠、頭痛、輕度鼻炎、結膜炎等前驅症狀，緊接在臉部及頸部會出現紅斑丘疹	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
馬堡病毒出血熱	迦納	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹，嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■ 手部衛生 ■ 負壓病室
屈公病	巴西、菲律賓、肯亞	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
布氏桿菌病	亞洲	發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、腹痛、疲倦及憂鬱，出現不明原因發燒或伴隨發燒之慢性關節炎	■ 手部衛生
炭疽病	克羅埃西亞、吉爾吉斯、獅子山共和國	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離