

一週國際疫情 111/09/19-111/09/25

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
登革熱	法國、巴西、哥斯大黎加、越南、寮國、	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
腸病毒	韓國、日本、美國、芬蘭、亞洲	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
兒童急性嚴重不明原因肝炎	全球	16歲以下且具急性肝炎症狀(如黃疸、茶色尿、疲倦、腹痛、胃口差、噁心、嘔吐)、AST或ALT >500 IU/L	■ 手部衛生
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
霍亂	亞洲、敘利亞	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
流感	韓國、全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩

伊波拉病毒感染	烏干達	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
瘧疾	秘魯	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
炭疽病	印度、烏干達、亞塞拜然	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
傷寒	菲律賓	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
恙蟲病	印度	症狀包括發燒、惡寒、頭痛、背痛及肌肉痛、淋巴結腫大、出疹等，通常在恙蟎叮咬的部位，會形成特有的洞穿式皮膚潰瘍型焦痂	■ 手部衛生
新型 A 型流感	美國	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、具有動物或農場/活禽市場暴露史	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
麻疹	澳洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
日本腦炎	日本	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）	■ 手部衛生
狂犬病	菲律賓	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
鉤端螺旋體病	菲律賓	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
發熱伴血小板減少	日本	發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、	■ 手部衛生

綜合症（SFTS）		頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常	■單人病室 ■接觸隔離
退伍軍人病	美國	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■手部衛生
鼠疫	剛果民主共和國	跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓痛且可能流膿	■手部衛生 ■接觸隔離
流行性腦脊髓膜炎	美國	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）	■手部衛生 ■接觸隔離