

一週國際疫情 111/11/28-111/12/4

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
登革熱	亞洲/美洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
伊波拉病毒感染	烏干達	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
霍亂	美洲、亞洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
麻疹	美洲、非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室

李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性（self-limited） 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 （以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見）	■ 手部衛生
兒童急性嚴重不明原因肝炎	全球	16 歲以下且具急性肝炎症狀（如黃疸、茶色尿、疲倦、腹痛、胃口差、噁心、嘔吐）、AST 或 ALT>500 IU/L、排除藥物、中毒性肝炎、自體免疫性肝炎、酒精性肝炎、膽道疾病、心血管疾病（如鬱血性心衰竭、休克等）	■ 手部衛生
西尼羅熱	歐洲	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■ 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	伊朗	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
漢他病毒症候群	美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
百日咳	玻利維亞/阿富汗	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
A 型肝炎	紐西蘭	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等	■ 手部衛生
恙蟲病	印度	症狀包括發燒、惡寒、頭痛、背痛及肌肉痛、淋巴結腫大、出疹等，通常在恙蟎叮咬的部位，會形成特有的洞穿式皮膚潰瘍型焦痂	■ 手部衛生
類鼻疽	香港/越南	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克	■ 手部衛生