

一週國際疫情 111/11/21-111/11/27

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
登革熱	亞洲/美洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
伊波拉病毒感染	烏干達	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
霍亂	亞洲、非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
麻疹	非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室

類鼻疽	香港/越南	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克	■ 手部衛生
李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性（self-limited）腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染（以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見）	■ 手部衛生
炭疽病	土耳其、肯亞、辛巴威	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
傷寒	菲律賓	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
鉤端螺旋體病	菲律賓	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
福氏內格里阿米巴 腦膜腦炎	巴基斯坦/美國	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	■ 手部衛生