

一週國際疫情 111/12/19-111/12/25

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
瘧疾	巴拿馬	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
漢他病毒症候群	南美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
茲卡病毒感染症	美洲/泰國	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	■ 手部衛生
桿菌性痢疾	加拿大/突尼西亞	腹瀉（每天 8~10 次以上）、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
麻疹	菲律賓/印度、美國	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室

登革熱	亞洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
百日咳	南非	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
流行性腦脊髓膜炎	加拿大	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
兔熱病	俄羅斯	高燒、寒顫、疲勞、身體痛、頭痛、噁心等，叮咬處會出現進展緩慢的潰瘍，有時伴隨局部淋巴結腫大、食入受污染的食物或水，則會有咽喉炎、腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀	■ 手部衛生
炭疽病	非洲	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
類鼻疽	香港/印度	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克	■ 手部衛生
日本腦炎	印度	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）	■ 手部衛生
侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症	加拿大	可能產生的臨床症狀包括：腦膜炎、菌血症、肺炎、蜂窩組織炎、敗血性關節炎、骨髓炎、會厭炎等	■ 在開始有效抗生素治療後 24 小時內需予呼吸道隔離 ■ 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	俄羅斯/烏干達	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離