

一週國際疫情 111/12/12-111/12/18

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

| 疾病 | 國家 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|----------------|---------|--|---|
| 新型冠狀病毒肺炎 | 全球 | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室 |
| 猴痘 | 全球 | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 |
| 小兒麻痺 | 全球 | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 炭疽病 | 非洲 | 急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 類鼻疽 | 香港/印度 | 皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |
| 日本腦炎 | 印度 | 急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等） | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |
| 侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症 | 加拿大 | 可能產生的臨床症狀包括：腦膜炎、菌血症、肺炎、蜂窩組織炎、敗血性關節炎、骨髓炎、會厭炎等 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 在開始有效抗生素治療後 24 小時內需予呼吸道隔離 ■ 手部衛生 |
| 克里米亞-剛果出血熱 | 俄羅斯/烏干達 | 發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |

| | | | |
|----------|-----------|---|--|
| 麻疹 | 美國 | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 |
| 登革熱 | 孟加拉、越南、美國 | 高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 伊波拉病毒感染 | 烏干達 | 初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室 |
| 流感 | 全球 | 發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 |
| 黃熱病 | 非洲 | 發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 李斯特菌症 | 義大利 | 發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |
| 白喉 | 歐洲 | 主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 外科口罩 ■ 手部衛生 |
| 鉤端螺旋體病 | 菲律賓 | 發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |
| 狂犬病 | 南非共和國 | 發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 澳洲 | 發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂 (譫妄) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 屈公病 | 美洲/亞洲 | 突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |