

一週國際疫情 112/04/17-112/04/23

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新型冠狀病毒肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
登革熱	馬來西亞、泰國、阿根廷、哥倫比亞	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
克里米亞-剛果出血熱	伊拉克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
瘧疾	哥斯大黎加、緬甸	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
霍亂	馬拉威、莫三比克、南蘇丹	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
馬堡病毒出血熱	赤道幾內亞/馬拉威	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹，嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 負壓病室
傷寒	菲律賓	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

流行性腦脊髓膜炎	澳洲	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
百日咳	加拿大、美國、紐西蘭	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
水痘	越南/加拿大	初期（紅疹出現前 1-2 天）包含輕微發燒（ $^{\circ}\text{C}$ ）、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 ■ 接觸隔離
狂犬病	菲律賓、越南、南非、紐西蘭	發燒、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩
麻疹	非洲、美洲、亞洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
腸病毒	越南	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
屈公病	阿根廷	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
白喉	菲律賓	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜（pseudomembrane），並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外科口罩 ■ 手部衛生
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生