

一週國際疫情 112/07/03-112/07/10

更新日期 112/07/10

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問**

*國內疫情：

| 疾病 | 縣市 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|-----|------------------------------|---|---|
| 登革熱 | 台南市(仁德區、東區)、 雲林縣(古坑鄉)、高雄市 | 高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

| 疾病 | 國家 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|------------|---------------|---|---|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 全球 | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室 |
| 小兒麻痺症 | 全球 | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 猴痘 | 全球 | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 |
| 克里米亞-剛果出血熱 | 伊拉克、阿富汗 | 發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 類鼻疽 | 香港、美國 | 皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |
| 登革熱 | 美洲、亞洲 | 高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 鼠疫 | 蒙古、美國、剛果民主共和國 | 跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓痛且可能流膿。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 麻疹 | 亞洲、非洲、美洲、歐洲 | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---|--|
| 屈公病 | 泰國、馬來西亞 | 突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 炭疽病 | 迦納、越南 | 急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 霍亂 | 莫比三克、剛果民主共和國、馬拉威、南非 | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 腸病毒 | 越南 | 泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 澳洲 | 發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 退伍軍人病 | 香港 | 厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 |
| 真菌性腦膜炎 | 美國、墨西哥 | 發燒、頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、意識模糊、畏光。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 |
| 瘧疾 | 美國 | 瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 傷寒 | 斐濟 | 發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 發熱伴血小板減少綜合症（SFTS） | 韓國 | 發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 單人病室 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 腸道出血性大腸桿菌感染症 | 歐洲 | 出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 西尼羅熱 | 美國、歐洲 | 發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 |
| 百日咳 | 加拿大、美國 | 咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩 |

| | | | |
|---------|-----|--|------------------------------------|
| | | 發紺表現。 | ■接觸隔離 |
| 日本腦炎 | 菲律賓 | 急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。 | ■手部衛生 |
| 沙門氏菌感染症 | 美國 | 一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀。 | ■手部衛生 |
| 水痘 | 巴拉圭 | 初期(紅疹出現前 1-2 天)包含輕微發燒(°C)、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮 | ■手部衛生 ■N95 口罩 ■負壓病室 ■接觸隔離 |