

一週國際疫情 112/07/10-112/07/16

更新日期 112/07/18

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問**

*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	台南市(仁德區、東區、永康區)、雲林縣(古坑鄉)、高雄市	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
克里米亞-剛果出血熱	亞洲、伊拉克、阿富汗	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	亞洲、美洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
麻疹	土耳其、亞洲、非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
炭疽病	亞洲、迦納、越南	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
霍亂	巴基斯坦、南非、莫比三克、剛果民主共和國、馬拉威	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

腸病毒	香港、越南	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人 心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
瘧疾	美國	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒 及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、 肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
百日咳	菲律賓	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、 咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或 發紺表現。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
鉤端螺旋體病	印度、斐濟	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠 痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血。	■ 手部衛生
福氏內格里阿米巴腦 膜腦炎	巴基斯坦	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、 意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺。	■ 手部衛生
白喉	奈及利亞	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位 形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、 咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞 呼吸道而致死。	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起 感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至 是全身性敗血症、休克。	■ 手部衛生
鼠疫	蒙古、美國	跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓 痛且可能流膿。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
屈公病	泰國、馬來西亞	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲 倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天 內使用蚊帳
流行性腦脊髓膜炎	澳洲	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及 神經學症狀，如精神錯亂 (譫妄)。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
退伍軍人病	香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天 之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及 下痢等症狀。	■ 手部衛生
真菌性腦膜炎	美國、墨西哥	發燒、頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、意識模糊、 畏光。	■ 手部衛生