

一週國際疫情 112/08/21-112/08/27

更新日期 112/08/28

* 國內疫情：

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	台南市(永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、中西區)、雲林縣(古坑鄉)、高雄市、屏東縣	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

* 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	孟加拉、泰國、馬來西亞、法國、美國	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
西尼羅熱	美國、義大利、法國、希臘、羅馬尼亞、匈牙利、塞爾維亞、俄羅斯	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹。	■ 手部衛生
鼠疫	中國、蒙古	跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓痛且可能流膿。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	阿富汗、伊拉克、巴基斯坦、北馬其頓	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
鉤端螺旋體病	烏克蘭、義大利、菲律賓	發燒、頭痛、腸胃不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血。	■ 手部衛生

流行性腦脊髓膜炎	挪威	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
瘧疾	美國	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
霍亂	非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
狂犬病	馬來西亞	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
百日咳	丹麥、玻利維亞、加拿大	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
腸道出血性大腸桿菌感染症	香港	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
麻疹	歐洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
水痘	巴拉圭	初期（紅疹出現前 1-2 天）包含輕微發燒（℃）、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 ■ 接觸隔離
第二型豬鏈球菌感染症	泰國、越南	工作因素需經常與豬隻或豬肉有密切接觸的人員，出現發燒、疲倦、無力、噁心及出血性休克，有時會引起腦膜炎、心內膜炎。	■ 手部衛生
腸病毒	越南	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
炭疽病	俄羅斯、吉爾吉斯	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
漢他病毒症候群	巴拿馬、美國	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭。	■ 手部衛生

日本腦炎	印度	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。	■ 手部衛生
地方性斑疹傷寒	美國	頭痛、畏寒、疲勞、發燒、肌肉酸痛和出疹等現象，急性腎衰竭、呼吸衰竭等併發症可能會發生，但不常見。	■ 手部衛生