

一週國際疫情 112/09/18-112/09/24

更新日期 112/09/26

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實14天內返國民眾旅遊史之詢問**

*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣	高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
登革熱	美洲、非洲、亞洲、查德	高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
麻疹	亞洲、非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
鉤端螺旋體病	紐西蘭、美國、歐洲	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
屈公病	塞內加爾	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續3~7天。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
肉毒桿菌中毒	阿根廷、西班牙	疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐，神經症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生

炭疽病	羅馬尼亞、俄羅斯、哈薩克	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
白喉	越南、非洲	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外科口罩 ■ 手部衛生
布氏桿菌病	哥斯大黎加、哈薩克、英國	發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、腹痛、疲倦及憂鬱，出現不明原因發燒或伴隨發燒之慢性關節炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
急性病毒性 A 型肝炎	黎巴嫩	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
瘧疾	美國	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
立百病毒感染症	印度	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 隔離衣 ■ 單人病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
退伍軍人病	西班牙、加拿大	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌感染症	日本、加拿大	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

梅毒	美國、日本	無痛性潰瘍與硬性下疳，皮疹，全身性淋巴腺腫，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髀部之淋巴腫。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
漢他病毒症候群	美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
立百病毒感染症	印度	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 隔離衣 ■ 單人病室
霍亂	非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
腸病毒	越南	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
狂犬病	南非	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離