

一週國際疫情 112/10/02-112/10/08

更新日期 112/10/09

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
登革熱	巴基斯坦、印度、尼泊爾、孟加拉、歐洲、美洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
漢他病毒症候群	美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
百日咳	塞爾維亞、澳洲	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
福氏內格里阿米巴腦膜腦炎	美國	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
桿菌性痢疾	美國	腹瀉(每天 8~10 次以上)、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

西尼羅熱	義大利	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■ 手部衛生
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	■ 手部衛生
退伍軍人病	歐洲、香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌感染症	挪威	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
日本腦炎	日本	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。	■ 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	阿富汗、印度、伊朗	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
兔熱病	瑞典	高燒、寒顫、疲勞、身體痛、頭痛、噁心等，叮咬處會出現進展緩慢的潰瘍，有時伴隨局部淋巴結腫大、食入受污染的食物或水，則會有咽喉炎、腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀	■ 手部衛生
茲卡病毒感染症	柬埔寨、法國	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳
拉薩熱	貝南	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室