

一週國際疫情 112/11/13-112/11/19

更新日期 112/11/20

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

* 國內疫情：

| 疾病 | 縣市 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|-----|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 登革熱 | 台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣 | 高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |

* 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

| 疾病 | 國家 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 全球 | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室 |
| 小兒麻痺症 | 全球 | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 猴痘 | 全球 | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 |
| 流感 | 全球 | 發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 |
| 霍亂 | 全球 | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 百日咳 | 韓國、美國 | 咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離 |
| 拉薩熱 | 非洲 | 初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室 |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 黃熱病 | 非洲 | 發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 屈公病 | 非洲 | 突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 克里米亞-剛果出血熱 | 巴基斯坦 | 發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 沙門氏菌感染症 | 美國 | 一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |
| 腸道出血性大腸桿菌感染症 | 挪威、丹麥 | 出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症 | 香港 | 可能產生的臨床症狀包括：腦膜炎、菌血症、肺炎、蜂窩組織炎、敗血性關節炎、骨髓炎、會厭炎等 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 在開始有效抗生素治療後 24 小時內需予呼吸道隔離 ■ 手部衛生 |
| 西尼羅熱 | 突尼西亞、歐洲 | 發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |
| 炭疽病 | 哈薩克、烏干達、尚比亞 | 急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 登革熱 | 香港 | 高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 瘧疾 | 韓國 | 瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |

| | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 第二型豬鏈球菌感染症 | 泰國 | 工作因素需經常與豬隻或豬肉有密切接觸的人員，出現發燒、疲倦、無力、噁心及出血性休克，有時會引起腦膜炎、心內膜炎。 | ■ 手部衛生 |
| 白喉 | 印度、非洲 | 主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜（pseudomembrane），並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。 | ■ 外科口罩 ■ 手部衛生 |
| 鈎端螺旋體病 | 希臘 | 發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血 | ■ 手部衛生 |
| 狂犬病 | 印度 | 發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛 | ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 麻疹 | 亞塞拜然 | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。 | ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 |
| 退伍軍人病 | 澳門 | 厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀 | ■ 手部衛生 |