

一週國際疫情 112/11/20-112/11/26

更新日期 112/11/27

*國內疫情：

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
沙門氏菌感染症	全球	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■ 手部衛生
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
白喉	巴基斯坦	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
桿菌性痢疾	美國	腹瀉 (每天 8~10 次以上)、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

流行性腮腺炎	印度	前趨症狀為 1-2 天的疲倦、食慾不振，接下來為腮腺疼痛、發燒、喉嚨痛，有時伴隨顎下腺的症狀。主要臨床特徵為發燒、頭痛、腮腺（耳下腺）腫大、一個或多個唾液腺腫大且壓痛。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
裂谷熱	烏干達	發燒、頭痛、疲勞、關節痛、肌肉痛，有時會有頸部僵硬、食慾減退、噁心、嘔吐、畏光、出血、休克、視網膜病變、腦膜腦炎、肝損傷	■ 手部衛生
恙蟲病	韓國	症狀包括發燒、惡寒、頭痛、背痛及肌肉痛、淋巴結腫大、出疹等，通常在恙蟎叮咬的部位，會形成特有的洞穿式皮膚潰瘍型焦痂	■ 手部衛生
登革熱	非洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
西尼羅熱	突尼西亞	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹。	■ 手部衛生
登革熱	非洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
鉤端螺旋體病	巴基斯坦	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
麻疹	非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
炭疽病	尚比亞、烏干達、哈薩克	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
拉薩熱	非洲	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室

黃熱病	非洲	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
屈公病	非洲	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
克里米亞-剛果出血熱	巴基斯坦	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
沙門氏菌感染症	美國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌感染症	挪威、丹麥	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症	香港	可能產生的臨床症狀包括：腦膜炎、菌血症、肺炎、蜂窩組織炎、敗血性關節炎、骨髓炎、會厭炎等	■ 在開始有效抗生素治療後 24 小時內需予呼吸道隔離 ■ 手部衛生