

一週國際疫情 112/12/04-112/12/10

更新日期 112/12/12

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣	高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩
沙門氏菌感染症	美洲、全球	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
恙蟲病	印度	症狀包括發燒、惡寒、頭痛、背痛及肌肉痛、淋巴結腫大、出疹等，通常在恙蟎叮咬的部位，會形成特有的洞穿式皮膚潰瘍型焦痂	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌感染症	日本	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
退伍軍人病	歐洲、香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生

百日咳	越南、克羅埃西亞	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
急性病毒性 A 型肝炎	巴基斯坦	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
西尼羅熱	歐洲	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌感染症	日本	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
呼吸道疾病	丹麥、荷蘭、中國	喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，約有 10% 的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
新型 A 型流感	英國、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
呼吸道疾病	中國	喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，約有 10% 的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
呼吸道融合病毒	美國	喘鳴、呼吸急促、咳嗽厲害或發燒等症狀，可聽到像是氣喘發作的咻咻聲，嚴重的病人甚至會伴隨著發紺、肋骨下凹陷、胸骨上凹陷，鼻翼煽動等症狀。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
霍亂	非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	巴基斯坦	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	美國、孟加拉、	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳