

# 一週國際疫情 112/12/11-112/12/17

更新日期 112/12/18

**\*因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

## \*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>

## \*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 單人病室</li> </ul>
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> </ul>
沙門氏菌感染症	美洲	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
日本腦炎	印尼	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
炭疽病	菲律賓、非洲	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>

黃熱病	非洲	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>
屈公病	非洲、印度	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>
腺病毒	日本	喉嚨痛（咽喉炎）、支氣管炎、肺炎、腹瀉、紅眼症（結膜炎）、發燒、膀胱發炎或感染、腸胃炎、神經疾病（較不常見）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
恙蟲病	印度	症狀包括發燒、惡寒、頭痛、背痛及肌肉痛、淋巴結腫大、出疹等，通常在恙蟲叮咬的部位，會形成特有的洞穿式皮膚潰瘍型焦痂	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
腸道出血性大腸桿菌感染症	日本	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
退伍軍人病	歐洲、香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
百日咳	越南、克羅埃西亞	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
急性病毒性 A 型肝炎	巴基斯坦	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
西尼羅熱	歐洲	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
腸道出血性大腸桿菌感染症	日本	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
呼吸道疾病	丹麥、荷蘭	喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，約有 10% 的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>