

一週國際疫情 112/12/25-112/12/31

更新日期 113/01/02

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩
漢他病毒症候群	智利	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
狂犬病	印度	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	塞內加爾	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
茲卡病毒感染症	馬利	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳
登革熱	奈及利亞、孟加拉、布吉納法索	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

呼吸道融合病毒	韓國、美國	喘鳴、呼吸急促、咳嗽厲害或發燒等症狀，可聽到像是氣喘發作的咻咻聲，嚴重的病人甚至會伴隨著發紺、肋骨下凹陷、胸骨上凹陷，鼻翼煽動等症狀。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
霍亂	葉門、印度	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
沙門氏菌感染症	美洲	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
德國麻疹	南非	輕微發燒、全身倦怠、頭痛、輕度鼻炎、結膜炎等前驅症狀，緊接在臉部及頸部會出現紅斑丘疹	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩
麻疹	歐洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
退伍軍人病	美國	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
百日咳	美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
急性病毒性 A 型肝炎	美國、敘利亞	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
拉薩熱	非洲	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室