一週國際疫情 113/01/08-113/01/14

更新日期 113/01/15

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
猴痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩
登革熱	非洲、斯里蘭卡、孟加拉	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
茲卡病毒感染症	泰國	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
沙門氏菌感染症	美國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生

第二型豬鏈球菌感染症	泰國	工作因素需經常與豬隻或豬肉有密切接觸的人員，出現發燒、疲倦、無力、噁心及出血性休克，有時會引起腦膜炎、心內膜炎。	■ 手部衛生
退伍軍人病	香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■ 手部衛生
麻疹	斯里蘭卡、	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
白喉	非洲	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
鉤端螺旋體病	菲律賓、印度	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
桿菌性痢疾	香港、歐洲、美國、英國	腹瀉 (每天 8~10 次以上)、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
狂犬病	越南、印度	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
急性病毒性 A 型肝炎	斯洛伐克	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌感染症	歐洲、香港	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
百日咳	美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離