

# 一週國際疫情 113/01/22-113/01/28

更新日期 113/01/29

**\* 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

**\* 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> </ul>
霍亂	尚比亞、全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
瘧疾	坦尚尼亞	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
Q 熱	澳洲	發燒、畏寒、盜汗、頭痛、身體不適、肌肉酸痛，肝炎、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
腸道出血性大腸桿菌感染症	香港	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
恙蟲病	尼泊爾	症狀包括發燒、惡寒、頭痛、背痛及肌肉痛、淋巴結腫大、出疹等，通常在恙蟎叮咬的部位，會形成特有的洞穿式皮膚潰瘍型焦痂	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
黃熱病	南蘇丹	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>

鉤端螺旋體病	法屬玻里尼西亞	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
拉薩熱	非洲	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
沙門氏菌感染症	美洲	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■ 手部衛生
退伍軍人病	美國、澳洲	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■ 手部衛生
麻疹	美洲、英國、哈薩克、 美國、吉爾吉斯	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
漢他病毒症候群	智利	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	茅利塔尼亞	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
肉毒桿菌中毒	羅馬尼亞	疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐，神經症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難	■ 手部衛生
登革熱	衣索比亞	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
茲卡病毒感染症	馬利	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳

類鼻疽	辛巴威	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	■ 手部衛生
狂犬病	印度	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
桿菌性痢疾	美國	腹瀉（每天 8~10 次以上）、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離