

一週國際疫情 113/02/26-113/03/03

更新日期 113/03/04

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
流感	全球	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
麻疹	歐洲、美國、全球	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
新型 A 型流感	香港、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
黃熱病	非洲	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
腸道出血性大腸桿菌感染症	美國、法國	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	非洲、秘魯、阿根廷、巴拉圭、巴西	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

霍亂	非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
漢他病毒症候群	美國、美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓 後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
百日咳	英國、馬爾地夫、菲律賓、泰國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
鼠疫	美國	跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓痛且可能流膿。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
傷寒	菲律賓	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
狂犬病	越南	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離