

# 一週國際疫情 113/03/18-113/03/24

更新日期 113/03/25

**\* 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

**\* 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
麻疹	亞洲、中東、北美洲、歐洲、非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
Q 熱	澳洲	發燒、畏寒、盜汗、頭痛、身體不適、肌肉酸痛，肝炎、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
流行性腦脊髓膜炎	奈及利亞	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
兔熱病	荷蘭	高燒、寒顫、疲勞、身體痛、頭痛、噁心等，叮咬處會出現進展緩慢的潰瘍，有時伴隨局部淋巴結腫大、食入受污染的食物或水，則會有咽喉炎、腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
流行性腮腺炎	印度	前趨症狀為 1-2 天的疲倦、食慾不振，接下來為腮腺疼痛、發燒、喉嚨痛，有時伴隨顎下腺的症狀。主要臨床特徵為發燒、頭痛、腮腺（耳下腺）腫大、一個或多個唾液腺腫大且壓痛。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> </ul>
狂犬病	越南	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>

鼠疫	美國	跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓痛且可能流膿。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
百日咳	中國、西班牙、英國、澳洲、北馬其頓	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
登革熱	泰國、印度、孟加拉	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>
炭疽病	寮國、烏干達	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
腸病毒	越南	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
類鼻疽	墨西哥、澳洲	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
桿菌性痢疾	美國	腹瀉(每天 8~10 次以上)、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
拉薩熱	非洲	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 連身型防護衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
茲卡病毒感染症	美洲	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起七天內使用蚊帳</li> </ul>
急性病毒性 E 型肝炎	芬蘭	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服，數天之後發生黃疸	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 腸胃道隔離</li> </ul>