

一週國際疫情 113/04/29-113/05/05

更新日期 113/05/06

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	全球、薩摩亞	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
百日咳	全球	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
新型 A 型流感	美國	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
退伍軍人病	香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
類鼻疽	越南、馬來西亞	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生

狂犬病	越南、菲律賓	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
李斯特菌症	歐洲、丹麥	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
沙門氏菌感染症	丹麥、美國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
腸病毒	東南亞	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
腸道出血性大腸桿菌感染症	美國	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	西班牙	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
黃熱病	巴西、南蘇丹	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
瘧疾	印度	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
肉毒桿菌中毒	美國	疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐，神經症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生

漢他病毒症候群	美洲	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓 後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
炭疽病	寮國	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
M 痘	剛果共和國	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
桿菌性痢疾	歐洲	腹瀉（每天 8~10 次以上）、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
屈公病	亞洲、美洲	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
流行性腦脊髓膜炎	澳洲	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離