

一週國際疫情 113/05/13-113/05/19

更新日期 113/05/20

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

| 疾病 | 國家 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|-------------|-----------|---|---|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 全球 | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室 |
| 小兒麻痺症 | 全球 | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| M 痘 | 全球 | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 |
| 登革熱 | 美洲、非洲 | 高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 百日咳 | 美洲、歐洲、葉門 | 咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離 |
| 新型 A 型流感 | 美國 | 急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室 |
| 急性病毒性 E 型肝炎 | 香港、德國、西班牙 | 突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服，數天之後發生黃疸 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 腸胃道隔離 |
| 炭疽病 | 非洲 | 急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |

| | | | |
|-------------|-----------|--|--|
| 西尼羅熱 | 印度 | 發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹 | ■ 手部衛生 |
| 鉤端螺旋體病 | 印度、西太平洋地區 | 發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血 | ■ 手部衛生 |
| 急性病毒性 A 型肝炎 | 印度、黎巴嫩 | 突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。 | ■ 手部衛生 |
| 麻疹 | 美洲、亞洲、歐洲 | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。 | ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 |
| 霍亂 | 非洲 | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭 | ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 水痘 | 墨西哥 | 初期(紅疹出現前 1-2 天)包含輕微發燒(°C)、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮 | ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 ■ 接觸隔離 |
| 拉薩熱 | 法國 | 初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷 | ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室 |
| 白喉 | 非洲 | 主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。 | ■ 外科口罩 ■ 手部衛生 |
| 伊波拉病毒感染 | 蒲隆地 | 初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。 | ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室 |

| | | | |
|------------|-------|--|---|
| 茲卡病毒感染症 | 美洲、亞洲 | 關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳 |
| 第二型豬鏈球菌感染症 | 泰國 | 工作因素需經常與豬隻或豬肉有密切接觸的人員，出現發燒、疲倦、無力、噁心及出血性休克，有時會引起腦膜炎、心內膜炎。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 |