

## 一週國際疫情 113/05/06-113/05/12

更新日期 113/05/13

**\*因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

**\*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

| 疾病          | 國家    | 臨床症狀                                                                              | 防護措施                                    |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 嚴重特殊傳染性肺炎   | 全球    | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。                                                          | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 防水隔離衣<br>■ 負壓病室 |
| 小兒麻痺症       | 全球    | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。                                                    | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                        |
| M 痘         | 全球    | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。                                                             | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 防水隔離衣<br>■ 單人病室 |
| 登革熱         | 全球、非洲 | 高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。                               | ■ 手部衛生<br>■ 發燒日起五天內使用蚊帳                 |
| 百日咳         | 全球    | 咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現                                | ■ 手部衛生<br>■ 外科口罩<br>■ 接觸隔離              |
| 霍亂          | 非洲    | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭                                                 | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                        |
| 新型 A 型流感    | 美國    | 急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。 | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 防水隔離衣<br>■ 負壓病室 |
| 急性病毒性 A 型肝炎 | 黎巴嫩   | 突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。                                             | ■ 手部衛生                                  |

|            |       |                                                                                                                       |                                          |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 麻疹         | 歐洲    | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。                                                                               | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 負壓病室             |
| 水痘         | 墨西哥   | 初期(紅疹出現前 1-2 天)包含輕微發燒(℃)、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮 | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 負壓病室<br>■ 接觸隔離   |
| 拉薩熱        | 法國    | 初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷                                                         | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 連身型防護衣<br>■ 負壓病室 |
| 白喉         | 非洲    | 主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。                                       | ■ 外科口罩<br>■ 手部衛生                         |
| 茲卡病毒感染症    | 美洲、亞洲 | 關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形                                                                                              | ■ 手部衛生<br>■ 發燒日起七天內使用蚊帳                  |
| 第二型豬鏈球菌感染症 | 泰國    | 工作因素需經常與豬隻或豬肉有密切接觸的人員，出現發燒、疲倦、無力、噁心及出血性休克，有時會引起腦膜炎、心內膜炎。                                                              | ■ 手部衛生                                   |
| 伊波拉病毒感染    | 蒲隆地   | 初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。                                  | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 連身型防護衣<br>■ 負壓病室 |
| 退伍軍人病      | 香港    | 厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀                                                                    | ■ 手部衛生                                   |

|              |         |                                                                  |                         |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 類鼻疽          | 越南、馬來西亞 | 皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。            | ■ 手部衛生                  |
| 狂犬病          | 越南、菲律賓  | 發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛                              | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離        |
| 李斯特菌症        | 歐洲      | 發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性（self-limited）腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染（以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見） | ■ 手部衛生                  |
| 沙門氏菌感染症      | 丹麥、美國   | 一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀             | ■ 手部衛生                  |
| 腸病毒          | 東南亞     | 泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心中包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。                     | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離        |
| 腸道出血性大腸桿菌感染症 | 美國      | 出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症                        | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離        |
| 克里米亞-剛果出血熱   | 西班牙     | 發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。                                            | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離        |
| 黃熱病          | 巴西、南蘇丹  | 發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐                                  | ■ 手部衛生<br>■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |