

# 一週國際疫情 113/05/27-113/06/02

更新日期 113/06/04

**\* 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

**\* 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

| 疾病        | 國家     | 臨床症狀   | 防護措施  |
|-----------|--------|--|---|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 全球     | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul> |
| 小兒麻痺症     | 全球     | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                    |
| 霍亂        | 全球     | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                    |
| 流行性腦脊髓膜炎  | 全球     | 發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                    |
| 西尼羅熱      | 印度     | 發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>  |
| 百日咳       | 美洲、捷克  | 咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                    |
| 屈公病       | 菲律賓、美洲 | 突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>                             |
| 黃熱病       | 玻利維亞   | 發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>                             |
| 霍亂        | 法屬馬約特島 | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                    |

|            |          |   |  |
|------------|----------|---|--|
| 新型 A 型流感   | 美國、澳洲    | 急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>  |
| 沙門氏菌感染症    | 美國、越南    | 一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>   |
| 克里米亞-剛果出血熱 | 伊拉克、塞內加爾 | 發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                     |
| 麻疹         | 美洲、非洲    | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>                   |
| 腸病毒        | 越南       | 泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                     |
| 瘧疾         | 越南       | 瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                     |
| 拉薩熱        | 非洲       | 初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 連身型防護衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul> |
| 漢他病毒症候群    | 玻利維亞、阿根廷 | 發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>   |
| 登革熱        | 非洲       | 高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>                              |
| 炭疽病        | 吉爾吉斯     | 急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                     |