

一週國際疫情 113/07/15-113/07/21

更新日期 113/07/22

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
百日咳	全球、中國、美洲	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
腸病毒	日本	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
日本腦炎	亞洲	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。	■ 手部衛生
漢他病毒症候群	美國	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
西尼羅熱	以色列	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■ 手部衛生
福氏內格里阿米巴腦膜腦炎	巴基斯坦、以色列	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	■ 手部衛生
新型 A 型流感	美國、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
克里米亞-剛果出血熱	伊拉克、巴基斯坦、土耳其	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	■ 手部衛生
李斯特菌症	加拿大	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性（self-limited）腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染（以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見）	■ 手部衛生
退伍軍人病	瑞典	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■ 手部衛生
霍亂	葉門	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	美洲、亞洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳