

一週國際疫情 113/07/29-113/08/04

更新日期 113/08/04

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
瘧疾	全球	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	非洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
新型 A 型流感	美國	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
腸病毒	韓國	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
西尼羅熱	美國	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
拉薩熱	非洲	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室

兔熱病	美國	高燒、寒顫、疲勞、身體痛、頭痛、噁心等，叮咬處會出現進展緩慢的潰瘍，有時伴隨局部淋巴結腫大、食入受污染的食物或水，則會有咽喉炎、腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
百日咳	英國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
麻疹	非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
黃熱病	哥倫比亞	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
霍亂	緬甸	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
立百病毒感染症	印度	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 隔離衣 ■ 單人病室