

一週國際疫情 113/08/12-113/08/18

更新日期 113/08/20

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
M 痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
白喉	越南	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 外科口罩 ■ 手部衛生
鉤端螺旋體病	菲律賓	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
百日咳	亞洲	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
急性病毒性 E 型肝炎	南蘇丹	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服，數天之後發生黃疸	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 腸胃道隔離

茲卡病毒感染症	印度	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳
梅毒	日本	無痛性潰瘍與硬性下疳，皮疹，全身性淋巴腺腫，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髖部之淋巴腫。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	亞洲	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
新型 A 型流感	美國	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
退伍軍人病	加拿大、澳洲、香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
麻疹	歐洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
炭疽病	海地、中國	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	烏干達、伊拉克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
流行性腦脊髓膜炎	非洲	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂 (譫妄)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

屈公病	法國	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續3~7天。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
福氏內格里阿米巴腦膜腦炎	以色列	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
西尼羅熱	以色列	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生