

更新日期 113/09/09

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
M 痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
退伍軍人病	全球	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■ 手部衛生
百日咳	全球	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	全球	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
新型 A 型流感	全球、美國	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	多國	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
西尼羅熱	美國	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■ 手部衛生

鉤端螺旋體病	印度	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
屈公病	印度	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	■ 手部衛生
狂犬病	巴西、越南	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
霍亂	蘇丹	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性（self-limited）腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染（以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見）	■ 手部衛生
沙門氏菌感染症	美國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■ 手部衛生
茲卡病毒感染症	印度	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳
麻疹	非洲	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室