

一週國際疫情 113/10/07-113/10/13

更新日期 113/10/14

*** 因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
M 痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
麻疹	非洲、越南	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
白喉	阿爾及利亞	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜(pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
日本腦炎	尼泊爾	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀(譫妄、意識不清等)。	■ 手部衛生

登革熱	中國、美國	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
福氏內格里阿米巴腦膜腦炎	印度	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	■ 手部衛生
狂犬病	象牙海岸、多國	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
馬堡病毒出血熱	盧安達、德國	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹，嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■ 手部衛生 ■ 負壓病室
類鼻疽	香港	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	■ 手部衛生
漢他病毒症候群	美國	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
黃熱病	南美洲	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
拉薩熱	非洲	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
百日咳	英國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
退伍軍人病	香港	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■ 手部衛生