

一週國際疫情 113/10/21-113/10/27

更新日期 113/10/29

***因應新型冠狀病毒肺炎疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*** 國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
M 痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
霍亂	全球、奈及利亞	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	全球、孟加拉	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
瘧疾	印度	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
類鼻疽	泰國	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌感染症	美國	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

立百病毒感染症	孟加拉	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調,發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常,有流行地區旅遊史、動物接觸史	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 隔離衣 ■ 單人病室
馬堡病毒出血熱	盧安達	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹,嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■ 手部衛生 ■ 負壓病室
小兒麻痺症	多國、全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
百日咳	中國、美國	咳嗽持續至少 2 週,陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
鉤端螺旋體病	菲律賓、多國	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
麻疹	多國、美國、阿根廷	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後,再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
屈公病	全球	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛,約半數皮疹,症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
白喉	巴基斯坦、印度	主要侵犯上呼吸道,在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜(pseudomembrane),並造成局部疼痛、咳嗽,甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
炭疽病	烏干達	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒,有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
西尼羅熱	歐洲	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■ 手部衛生

第二型豬鏈球菌感染症	泰國	工作因素需經常與豬隻或豬肉有密切接觸的人員，出現發燒、疲倦、無力、噁心及出血性休克，有時會引起腦膜炎、心內膜炎。	■ 手部衛生
------------	----	--	--------