

# 一週國際疫情 114/03/3-114/03/9

更新日期 114/03/10

**\*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

**\*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

| 疾病       | 國家                        | 臨床症狀                                                                              | 防護措施                                                                                                                               |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新冠併發重症   | 全球、柬埔寨                    | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩)</li> <li>■ 防水隔離衣</li> </ul>                             |
| 新型 A 型流感 | 全球、美國                     | 急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>                        |
| 麻疹       | 美國、越南、日本、加拿大、英國           | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>                                         |
| M 痘      | 全球、南非、非洲、剛果民主共和國(非洲)、巴基斯坦 | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 單人病室</li> <li>■ 負壓病室(非洲旅遊史)</li> </ul> |
| 小兒麻痺     | 全球、亞洲、非洲                  | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>                                                           |
| 登革熱      | 越南、斯里蘭卡、孟加拉               | 高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發病日起五天內使用蚊帳</li> </ul>                                                    |

|          |           |                                                                                     |                                          |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 伊波拉病毒感染  | 烏干達       | 初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭 | ■ 手部衛生<br>■ N95 口罩<br>■ 連身型防護衣<br>■ 負壓病室 |
| 霍亂       | 全球        | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭                                                   | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                         |
| 茲卡病毒感染症  | 美洲        | 關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形                                                            | ■ 手部衛生<br>■ 發病日起七天內使用蚊帳                  |
| 百日咳      | 美國        | 咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現                                  | ■ 手部衛生<br>■ 外科口罩<br>■ 接觸隔離               |
| 狂犬病      | 印尼        | 發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛                                                 | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                         |
| 屈公病      | 印尼、法屬留尼旺島 | 突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。                                       | ■ 手部衛生<br>■ 發病日起五天內使用蚊帳                  |
| 李斯特菌症    | 美國        | 發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性（self-limited）腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染（以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見）                    | ■ 手部衛生                                   |
| 瘧疾       | 衣索比亞      | 瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。                       | ■ 手部衛生<br>■ 燒退之前應使用蚊帳                    |
| 流行性腦脊髓膜炎 | 法國        | 發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）                                               | ■ 手部衛生<br>■ 接觸隔離                         |