

一週國際疫情 114/03/17-114/03/23

更新日期 114/03/24

***因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
麻疹	歐洲、菲律賓、越南、亞洲、美洲、大洋洲、全球、日本、加拿大	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
M 痘	全球、瑞典、巴基斯坦	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 ■ 負壓病室(非洲旅遊史)
登革熱	美洲、菲律賓、阿根廷、東加	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發病日起五天內使用蚊帳
日本腦炎	澳大利亞	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀(譫妄、意識不清等)。	■ 手部衛生

小兒麻痺	亞洲、非洲	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
百日咳	日本	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
狂犬病	菲律賓、印度	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
傷寒	菲律賓	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	烏干達、克里米亞、伊拉克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
馬堡病毒出血熱	坦尚尼亞	燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹，嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
立百病毒感染症	孟加拉	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 隔離衣 ■ 單人病室
李斯特菌症	英國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	■ 手部衛生
流行性腦脊髓膜炎	奈及利亞	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂 (譫妄)	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
福氏內格里阿米巴腦膜腦炎	巴基斯坦	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	■ 手部衛生

漢他病毒症候群	美國	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■手部衛生
伊波拉病毒感染	烏干達	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
屈公病	全球	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■手部衛生 ■發病日起五天內使用蚊帳
拉薩熱	奈及利亞、美國	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
沙門氏菌感染症	歐洲	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■手部衛生
黃熱病	哥倫比亞	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	■手部衛生 ■發燒日起五天內使用蚊帳