

一週國際疫情 114/03/10-114/03/16

更新日期 114/03/17

***因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
麻疹	全球、日本、加拿大、美國、越南、	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
M 痘	瑞典、巴基斯坦、全球、非洲(南非)	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 ■ 負壓病室(非洲旅遊史)
登革熱	菲律賓、阿根廷、東加、越南、斯里蘭卡、孟加拉	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發病日起五天內使用蚊帳
漢他病毒症候群	美國	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生

伊波拉病毒感染	烏干達	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
屈公病	全球、印尼	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■手部衛生 ■發病日起五天內使用蚊帳
拉薩熱	奈及利亞、美國	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
克里米亞-剛果出血熱	伊拉克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■手部衛生 ■接觸隔離
沙門氏菌感染症	歐洲	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■手部衛生
小兒麻痺	全球、	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■手部衛生 ■接觸隔離
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■手部衛生 ■接觸隔離
茲卡病毒感染症	美洲	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	■手部衛生 ■發病日起七天內使用蚊帳
百日咳	美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■手部衛生 ■外科口罩 ■接觸隔離
狂犬病	印尼	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■手部衛生 ■接觸隔離

