

# 一週國際疫情 114/5/12-114/05/18

更新日期 114/05/19

**\*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

## \*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
麻疹	台中 (足跡詳見院內疫情專區及國家政策)	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>

## \*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩)</li> <li>■ 防水隔離衣</li> </ul>
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
麻疹	摩洛哥、北美洲、澳大利亞、韓國、美洲、法國	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
急性病毒性 A 型肝炎	烏克蘭、日本、韓國、美國	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
登革熱	薩摩亞、菲律賓、東加	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發病日起五天內使用蚊帳</li> </ul>
腸病毒	亞洲、新加坡、日本、韓國、香港	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>

M 痘	巴西、獅子山、英國	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 單人病室</li> <li>■ 負壓病室(非洲旅遊史)</li> </ul>
百日咳	日本、墨西哥、美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
屈公病	法屬留尼旺島、法國、斯里蘭卡、剛果民主共和國	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>
炭疽病	泰國、泰國	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
黃熱病	秘魯	發燒、肝功能異常、頭痛、背痛、全身肌、肉酸痛、虛脫、噁心、嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>
流行性腦脊髓膜炎	越南	發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄）	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
立百病毒感染症	印度	腦病變(意識改變 $\geq 24$ 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> <li>■ 隔離衣</li> <li>■ 單人病室</li> </ul>
梅毒與先天性梅毒	加拿大	無痛性潰瘍與硬性下疳，皮疹，全身性淋巴腺腫，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髖部之淋巴腫。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
流感	美國	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> </ul>

瘧疾	納米比亞	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
拉薩熱	奈及利亞	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 連身型防護衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>