

一週國際疫情 114/6/16-114/6/22

更新日期 114/06/23

***因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
麻疹	臺中市 (足跡詳見院內疫情專區及國家政策)	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球、印度	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
麻疹	蒙古、荷蘭、加拿大、德國、波蘭、義大利、捷克、英國、玻利維亞、美國	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
百日咳	日本、美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
腸病毒	中國、韓國、新加坡、日本、香港、越南	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
流感	韓國、巴西	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩

小兒麻痺	安哥拉、尼日、貝南、巴基斯坦、衣索比亞、葉門、查德	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	孟加拉、印尼、巴西	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發病日起五天內使用蚊帳
屈公病	法國、巴西、法屬馬約特島、	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
霍亂	全球、南蘇丹、阿富汗、安哥拉	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
沙門氏菌感染症	韓國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■ 手部衛生
拉薩熱	奈及利亞	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
發熱伴血小板減少綜合症 (SFTS)	日本	發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常	■ 手部衛生 ■ 單人病室 ■ 接觸隔離
李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	■ 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	伊拉克、喬治亞、克里米亞	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
布氏桿菌病	墨西哥、蒙特內哥羅	發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、腹痛、疲倦及憂鬱，出現不明原因發燒或伴隨發燒之慢性關節炎	■ 手部衛生

M 痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 ■ 負壓病室(非洲旅遊史)
急性病毒性 A 型肝炎	中國、印度、英國、匈牙利	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	■ 手部衛生
白喉	歐洲、德國	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜（pseudomembrane），並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
傷寒	英國、巴基斯坦	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
狂犬病	西班牙、依索比亞、摩洛哥	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
兔熱病	美國	高燒、寒顫、疲勞、身體痛、頭痛、噁心等，叮咬處會出現進展緩慢的潰瘍，有時伴隨局部淋巴結腫大、食入受污染的食物或水，則會有咽喉炎、腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀	■ 手部衛生