

一週國際疫情 114/6/23-114/6/29

更新日期 114/06/30

***因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球、印度	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
麻疹	美國、加拿大、墨西哥、蒙古、荷蘭	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
M 痘	非洲、美國	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 ■ 負壓病室(非洲旅遊史)
百日咳	日本	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
腸病毒	韓國、新加坡、日本、香港、越南、中國	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
屈公病	全球、法國	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

登革熱	菲律賓、越南、孟加拉	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發病日起五天內使用蚊帳
茲卡病毒感染症	韓國、新加坡	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳
沙門氏菌感染症	德國、奧地利、韓國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
急性病毒性 A 型肝炎	葡萄牙	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
漢他病毒症候群	印尼	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
鉤端螺旋體病	厄瓜多	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
小兒麻痺	衣索比亞、貝南、安哥拉、尼日、	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
狂犬病	中國、美國、摩洛哥	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
福氏內格里阿米巴腦膜腦炎	斯洛伐克	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	巴基斯坦、伊拉克、喬治亞、克里米亞	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
流感	韓國、巴西	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩
霍亂	全球、南蘇丹、阿富汗、安哥拉	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

拉薩熱	奈及利亞	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
發熱伴血小板減少綜合症 (SFTS)	日本	發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 單人病室 ■ 接觸隔離
李斯特菌症	美國	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生
布氏桿菌病	墨西哥、蒙特內哥羅	發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、腹痛、疲倦及憂鬱，出現不明原因發燒或伴隨發燒之慢性關節炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生