

一週國際疫情 114/7/14-114/7/20

更新日期 114/07/21

*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩(或視情況 N95 口罩) <input type="checkbox"/> 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、印度、孟加拉	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 負壓病室
麻疹	加拿大、美國、韓國、越南、烏茲別克、義大利、泰國、蒙古、英國、美洲、吉爾吉斯	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、班丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 負壓病室
M 痘	中國、幾內亞(非洲)、土耳其、泰國	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 單人病室 <input type="checkbox"/> 負壓病室(非洲旅遊史)
百日咳	日本	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩 <input type="checkbox"/> 接觸隔離
腸病毒	亞洲	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 接觸隔離
登革熱	孟加拉、巴拿馬、宏都拉斯、馬利	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 發病日起五天內使用蚊帳

小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
屈公病	中國、義大利、法國	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續3~7天。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳
克里米亞-剛果出血熱	西班牙	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
急性病毒性 A 型肝炎	巴西	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
瘧疾	納米比亞、韓國	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 退燒之前應使用蚊帳
拉薩熱	幾內亞	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 連身型防護衣 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室
鼠疫	美國	跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓痛且可能流膿。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
霍亂	非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
炭疽病	塔吉克、剛果民主共和國、	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
鉤端螺旋體病	不丹	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
狂犬病	澳大利亞、印度、南非	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生

沙門氏菌感染症	西班牙	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
茲卡病毒感染症	孟加拉	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發燒日起七天內使用蚊帳
立百病毒感染症	印度	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 隔離衣 <input checked="" type="checkbox"/> 單人病室