

一週國際疫情 114/7/07-114/7/13

更新日期 114/07/14

***因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

***國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
麻疹	美洲、吉爾吉斯、蒙古、玻利維亞	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
M 痘	泰國、全國	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室 ■ 負壓病室(非洲旅遊史)
百日咳	日本	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
腸病毒	亞洲、中國、香港、日本、韓國、越南、泰國	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	宏都拉斯、馬利、孟加拉、柬埔寨	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發病日起五天內使用蚊帳

小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
屈公病	法國	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
炭疽病	塔吉克、剛果民主共和國、哈薩克	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
鉤端螺旋體病	不丹	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■ 手部衛生
狂犬病	澳大利亞、印度、南非	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
沙門氏菌感染症	西班牙	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■ 手部衛生
茲卡病毒感染症	孟加拉	關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎、小頭畸形	■ 手部衛生 ■ 發燒日起七天內使用蚊帳
立百病毒感染症	印度	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 隔離衣 ■ 單人病室
傷寒	印度	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
發熱伴血小板減少綜合症 (SFTS)	日本、韓國	發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常	■ 手部衛生 ■ 單人病室 ■ 接觸隔離

福氏內格里阿米巴 腦膜腦炎	中國、巴基斯坦	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、 意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	■ 手部衛生
腸道出血性大腸桿菌 感染症	法國	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶 血性尿毒症候 群或栓塞性血小板減少性紫斑症	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
克里米亞-剛果出血熱	希臘、伊拉克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離