

# 一週國際疫情 114/8/4-114/8/10

更新日期 114/08/11

**\*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

**\*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)**

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩)</li> <li>■ 防水隔離衣</li> </ul>
新型 A 型流感	全球、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
腸病毒	亞洲	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
M 痘	全球、非洲、甘比亞(非洲)、幾內亞(非洲)、獅子山(非洲)	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 單人病室</li> <li>■ 負壓病室(非洲旅遊史)</li> </ul>
百日咳	日本	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
屈公病	中國、澳門、香港	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>
登革熱	薩摩亞	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發病日起五天內使用蚊帳</li> </ul>

麻疹	墨西哥、剛果民主共和國、 葉門	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、 斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻 痺、無菌性腦膜炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
類鼻疽	泰國	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起 感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至 是全身性敗血症、休克。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
鉤端螺旋體病	泰國、菲律賓	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠 痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
狂犬病	尼泊爾、菲律賓、印尼	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸 困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
西尼羅熱	歐洲、義大利	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、 淋巴腺腫大及軀幹皮疹	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
拉薩熱	奈及利亞	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、 腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血， 低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 連身型防護衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
退伍軍人病	美國	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛 及下痢等症狀	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快 速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
急性病毒性 A 型肝炎	中國、中歐	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、 噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> </ul>
瘧疾	辛巴威、波札那、史瓦帝尼、 納米比亞	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒 及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、 肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 退燒之前應使 用蚊帳</li> </ul>

福氏內格里阿米巴 腦膜腦炎	美國	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	■ 手部衛生
兔熱病	美國	高燒、寒顫、疲勞、身體痛、頭痛、噁心等，叮咬處會出現進展緩慢的潰瘍，有時伴隨局部淋巴結腫大、食入受污染的食物或水，則會有咽喉炎、腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀	■ 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	伊拉克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
李斯特菌症	愛爾蘭	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	■ 手部衛生