

# 一週國際疫情 114/8/11-114/8/17

更新日期 114/08/18

\*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

\*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩(或視情況 N95 口罩) <input type="checkbox"/> 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 負壓病室
腸病毒	日本、香港、亞洲	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 接觸隔離
M 痘	非洲、全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 單人病室 <input type="checkbox"/> 負壓病室(非洲旅遊史)
登革熱	全球、薩摩亞	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 發病日起五天內使用蚊帳
麻疹	以色列、蒙古、韓國、越南、南非、烏茲別克、泰國、義大利、日本、墨西哥、剛果民主共和國、葉門	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 負壓病室
百日咳	日本	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩 <input type="checkbox"/> 接觸隔離

屈公病	中國、澳門、香港	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續3~7天。	■手部衛生 ■發燒日起五天內使用蚊帳
小兒麻痺	歐洲、亞洲、非洲、全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■手部衛生 ■接觸隔離
鉤端螺旋體病	菲律賓、泰國	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■手部衛生
發熱伴血小板減少綜合症 (SFTS)	日本	發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常	■手部衛生 ■單人病室 ■接觸隔離
西尼羅熱	義大利、保加利亞、法國、希臘、匈牙利、羅馬尼亞、歐洲	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■手部衛生
急性病毒性 A 型肝炎	挪威	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	■手部衛生
桿菌性痢疾	南非	腹瀉 (每天 8~10 次以上)、發燒、噁心，或 有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	■手部衛生 ■接觸隔離
白喉	索馬利亞	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■外科口罩 ■手部衛生
類鼻疽	泰國	皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，局部皮膚潰瘍，到以嚴重肺炎表現，甚至是全身性敗血症、休克。	■手部衛生
狂犬病	尼泊爾	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■手部衛生
退伍軍人病	美國	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■手部衛生

拉薩熱	奈及利亞	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 手部衛生</li><li>■ N95 口罩</li><li>■ 連身型防護衣</li><li>■ 負壓病室</li></ul>
-----	------	---	---