

*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩(或視情況 N95 口罩) <input type="checkbox"/> 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、中國、美國	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 負壓病室
M 痘	泰國、日本、全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 單人病室 <input type="checkbox"/> 負壓病室(非洲旅遊史)
屈公病	中國、孟加拉、法國、義大利	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳
麻疹	美國、中國、英國、加拿大、墨西哥	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 負壓病室
百日咳	日本	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩 <input type="checkbox"/> 接觸隔離

腸病毒	中國、泰國	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人之心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■手部衛生 ■接觸隔離
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■手部衛生 ■接觸隔離
退伍軍人病	美國	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■手部衛生
福氏內格里阿米巴腦膜腦炎	巴基斯坦	發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺	■手部衛生
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
狂犬病	泰國	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■手部衛生
鼠疫	蒙古	跳蚤咬傷部位附近淋巴腺發炎、發燒、紅腫、壓痛且可能流膿。	■手部衛生 ■接觸隔離
西尼羅熱	義大利、希臘、塞爾維亞、法國、羅馬尼亞、匈牙利、西班牙、阿爾巴尼亞、保加利亞	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	■手部衛生
傷寒	迦納、印度	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	■手部衛生 ■接觸隔離
炭疽病	孟加拉、哈薩克	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■手部衛生 ■接觸隔離
急性病毒性 A 型肝炎	捷克	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	■手部衛生
霍亂	中國、查德	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	■手部衛生 ■接觸隔離

登革熱	孟加拉、越南	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發病日起五天內使用蚊帳
日本腦炎	尼泊爾	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
拉薩熱	奈及利亞	初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 連身型防護衣 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室
腸道出血性大腸桿菌 感染症	德國	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離