

一週國內外疫情 114/9/08-114/9/14

更新日期 114/09/15

*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

*國內疫情：

| 疾病 | 縣市 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|-----|----|---|---|
| 登革熱 | 高雄 | 高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發病日起五天內使用蚊帳 |

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

| 疾病 | 國家 | 臨床症狀 | 防護措施 |
|----------|-------------------|---|---|
| 新冠併發重症 | 全球 | 發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣 |
| 新型 A 型流感 | 全球、中國、美國 | 急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室 |
| 屈公病 | 中國、法國、義大利、全國 | 突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳 |
| 麻疹 | 英國、美國、加拿大、墨西哥、以色列 | 突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室 |
| 霍亂 | 中國、查德、全國 | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |
| 腸病毒 | 泰國 | 泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離 |

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| 登革熱 | 孟加拉、越南 | 高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發病日起五天內使用蚊帳 |
| 小兒麻痺 | 全球、巴布亞紐幾內亞 | 發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 炭疽病 | 哈薩克 | 急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| 退伍軍人病 | 美國 | 厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 |
| 伊波拉病毒感染 | 剛果民主共和國 | 初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 連身型防護衣 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室 |
| 日本腦炎 | 尼泊爾 | 急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 |
| 拉薩熱 | 奈及利亞 | 初期症狀為發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛、胸痛、腹痛及咳嗽，重症者出現顏面腫大、腸胃道出血，低血壓後期出現休克、神經症狀及昏迷 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 連身型防護衣 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室 |
| 腸道出血性大腸桿菌感染症 | 德國 | 出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離 |
| M 痘 | 全國 | 發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。 | <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input checked="" type="checkbox"/> 單人病室 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室(非洲旅遊史) |

| | | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| 百日咳 | 美洲、日本、英國、法屬留尼旺島 | 咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現 | ■手部衛生 ■外科口罩 ■接觸隔離 |
| 流感併發重症 | 全國 | 發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎 | ■手部衛生 ■外科口罩 |
| 鉤端螺旋體病 | 菲律賓 | 發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血 | ■手部衛生 |
| 福氏內格里阿米巴腦膜腦炎 | 印度 | 發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺 | ■手部衛生 |
| 霍亂 | 全國 | 無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭 | ■手部衛生 ■接觸隔離 |
| 克里米亞-剛果出血熱 | 伊拉克 | 發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。 | ■手部衛生 ■接觸隔離 |
| 狂犬病 | 墨西哥 | 發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛 | ■手部衛生 |
| 傷寒 | 迦納 | 發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大 | ■手部衛生 ■接觸隔離 |