

# 一週國內外疫情 114/10/13-114/10/19

更新日期 114/10/20

\*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

\*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩(或視情況 N95 口罩) <input type="checkbox"/> 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、中國	急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 負壓病室
M 痘	西班牙、非洲、美國	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 單人病室 <input type="checkbox"/> 負壓病室(非洲旅遊史)
流感	日本、泰國、馬來西亞	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩
屈公病	中國、歐洲、美國、全球	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳
麻疹	墨西哥、以色列、加拿大、法屬留尼旺島	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 負壓病室

百日咳	美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
小兒麻痺	全球	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
西尼羅熱	美國	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
狂犬病	越南	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
沙門氏菌感染症	加拿大、英國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	哈薩克	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
李斯特菌症	瑞典	發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之自限性 (self-limited) 腸胃炎表現可導致敗血症及中樞神經系統感染 (以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見)	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
腸病毒	墨西哥	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離

急性病毒性 A 型肝炎	斯洛伐克	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	■ 手部衛生
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
白喉	芋利塔尼亞	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■ 外科口罩 ■ 手部衛生
炭疽病	孟加拉	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離