

一週國內外疫情 114/10/27-114/11/02

更新日期 114/11/03

*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩(或視情況 N95 口罩) <input type="checkbox"/> 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、柬埔寨	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input type="checkbox"/> 負壓病室
急性病毒性 A 型肝炎	捷克	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<input type="checkbox"/> 手部衛生
屈公病	中國、香港、巴西	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳
麻疹	美國、以色列	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> N95 口罩 <input type="checkbox"/> 負壓病室
百日咳	阿根廷	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 外科口罩 <input type="checkbox"/> 接觸隔離
西尼羅熱	歐洲、美國	發燒、頭痛、倦怠、關節痛、肌痛、腸胃不適、淋巴腺腫大及軀幹皮疹	<input type="checkbox"/> 手部衛生

沙門氏菌感染症	加拿大、義大利	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■手部衛生
腸道出血性大腸桿菌 感染症	德國	出現腸胃道症狀，嚴重者可導致出血性腹瀉、溶血性尿毒症候群或栓塞性血小板減少性紫斑症	■手部衛生 ■接觸隔離
登革熱	孟加拉、菲律賓、馬爾地夫	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■手部衛生 ■發燒日起五天內使用蚊帳
炭疽病	祕魯、賴索托	急性症狀包括皮膚丘疹、焦痂、呼吸困難、缺氧、發燒，有些出現腹部急症、咽喉紅腫。	■手部衛生 ■接觸隔離
狂犬病	馬來西亞、葉門	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■手部衛生
日本腦炎	尼泊爾	急性神經症狀：發燒、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、頭痛、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清等）。	■手部衛生
裂谷熱	塞內加爾	發燒、頭痛、疲勞、關節痛、肌肉痛，有時會有頸部僵硬、食慾減退、噁心、嘔吐、畏光、出血、休克、視網膜病變、腦膜腦炎、肝損傷	■手部衛生
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室

白喉	非洲	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜（pseudomembrane），並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	<input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
----	----	--	--