

一週國內外疫情 114/11/24-114/11/30

更新日期 114/12/01

*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	高雄市、屏東	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩(或視情況 N95 口罩) <input checked="" type="checkbox"/> 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室
屈公病	全球、中國、香港	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳
肉毒桿菌中毒	美國	疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐，神經症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
白喉	非洲	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	<input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生

鉤端螺旋體病	牙買加	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■手部衛生
馬堡病毒出血熱	衣索比亞	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹，嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
克里米亞-剛果出血熱	納米比亞	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■手部衛生 ■接觸隔離
流感	亞洲、中國、日本、英國	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■手部衛生 ■外科口罩
登革熱	菲律賓、阿富汗、孟加拉、墨西哥、美國	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■手部衛生 ■發燒日起五天內使用蚊帳
腸病毒	香港、泰國、日本、辛巴威、中國、新加坡、	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人之心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■手部衛生 ■接觸隔離
M 痘	荷蘭	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■手部衛生 ■N95 口罩 ■防水隔離衣 ■單人病室

急性病毒性 A 型肝炎	捷克	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生
霍亂	非洲	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
麻疹	美國、越南	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室
百日咳	葉門	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離