

# 一週國內外疫情 114/12/01-114/12/07

更新日期 114/12/08

\*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問

## \*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	高雄市、屏東	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳

## \*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 外科口罩(或視情況 N95 口罩) <input checked="" type="checkbox"/> 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input checked="" type="checkbox"/> 負壓病室
M 痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> N95 口罩 <input checked="" type="checkbox"/> 防水隔離衣 <input checked="" type="checkbox"/> 單人病室
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 接觸隔離
屈公病	全球	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	<input checked="" type="checkbox"/> 手部衛生 <input checked="" type="checkbox"/> 發燒日起五天內使用蚊帳

麻疹	美國、波蘭、剛果民主共和國、烏干達	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■手部衛生 ■N95 口罩 ■負壓病室
百日咳	美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■手部衛生 ■外科口罩 ■接觸隔離
瘧疾	奈及利亞	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	■手部衛生 ■接觸隔離
馬堡病毒出血熱	衣索比亞	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹，嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
小兒麻痺	納米比亞	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	■手部衛生 ■接觸隔離
沙門氏菌感染症	美國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■手部衛生
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。	■手部衛生 ■N95 口罩 ■連身型防護衣 ■負壓病室
流感	日本、亞洲	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■手部衛生 ■外科口罩

腸病毒	韓國、泰國、日本、香港、辛巴威	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人之心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■手部衛生 ■接觸隔離
登革熱	越南、孟加拉、茅利塔尼亞、蘇丹、菲律賓、阿富汗	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■手部衛生 ■發燒日起五天內使用蚊帳
肉毒桿菌中毒	美國	疲倦、眩暈、腹瀉、腹痛及嘔吐，神經症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難	■手部衛生
白喉	非洲	主要侵犯上呼吸道，在鼻腔、扁桃腺、咽喉部位形成偽膜 (pseudomembrane)，並造成局部疼痛、咳嗽，甚至呼吸困難。致死原因多因為偽膜阻塞呼吸道而致死。	■外科口罩 ■手部衛生
鉤端螺旋體病	牙買加	發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉痠痛、腦膜炎腎衰竭、黃疸、出血	■手部衛生
克里米亞-剛果出血熱	納米比亞	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■手部衛生 ■接觸隔離