

# 一週國內外疫情 114/12/08-114/12/14

更新日期 114/12/15

**\*因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

## \*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	高雄市、屏東	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 發燒日起五天內使用蚊帳</li> </ul>

## \*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩)</li> <li>■ 防水隔離衣</li> </ul>
新型 A 型流感	全球	急性呼吸道感染、高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 負壓病室</li> </ul>
M 痘	全球	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ N95 口罩</li> <li>■ 防水隔離衣</li> <li>■ 單人病室</li> </ul>
小兒麻痺	全球、納米比亞	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>
霍亂	全球	無痛性大量米湯樣水性腹瀉，偶而伴有嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 手部衛生</li> <li>■ 接觸隔離</li> </ul>

屈公病	香港	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續 3~7 天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
狂犬病	美國	發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
退伍軍人病	美國	厭食、身體不適、肌痛與頭痛等症狀。通常在 1 天之內會快速發燒且伴隨畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀	■ 手部衛生
梅毒與先天性梅毒	匈牙利	無痛性潰瘍與硬性下疳，皮疹，全身性淋巴腺腫，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髀部之淋巴腫。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
急性病毒性 A 型肝炎	奧地利、捷克、匈牙利、斯洛維尼亞	突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等。	■ 手部衛生
桿菌性痢疾	英國、維德角	腹瀉（每天 8~10 次以上）、發燒、噁心，或有毒血症、嘔吐、腹痛及裏急後重	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
裂谷熱	塞內加爾	發燒、頭痛、疲勞、關節痛、肌肉痛，有時會有頸部僵硬、食慾減退、噁心、嘔吐、畏光、出血、休克、視網膜病變、腦膜腦炎、肝損傷	■ 手部衛生
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症	法國	肺炎，部分重症則出現急性腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血等併發症	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室

麻疹	加拿大、美國、波蘭、剛果民主共和國、烏干達	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
流感	中國、日本	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
腸病毒	越南、中國、韓國、泰國、日本	疱疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
登革熱	印度、寮國、美國、越南、孟加拉、茅利塔尼亞、蘇丹	高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
百日咳	美國	咳嗽持續至少 2 週，陣發性咳嗽、吸入性哮聲、咳嗽後嘔吐、小於 3 個月嬰兒常會以暫停呼吸或發紺表現	■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 接觸隔離
瘧疾	奈及利亞	瘧疾早期的症狀與流感類似，症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗，嚴重者脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
馬堡病毒出血熱	衣索比亞	高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛、全身紅疹，嚴重腹瀉、腹痛、噁心感及嘔吐、眼窩深陷、面無表情且嗜睡、意識不清、易怒或攻擊性行為	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 連身型防護衣 ■ 負壓病室
沙門氏菌感染症	美國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	■ 手部衛生

伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	<p>初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。</p>	<p>           ■ 手部衛生            ■ N95 口罩            ■ 連身型防護衣            ■ 負壓病室         </p>
---------	---------	---	---