

一週國內外疫情 115/01/19-115/01/25

更新日期 115/01/27

***因應國內外疫情，請落實 14 天內返國民眾旅遊史之詢問**

*國內疫情：

疾病	縣市	臨床症狀	防護措施
登革熱	高雄市、屏東	高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳

*國際疫情：(紅字代表此周流行區域)

疾病	國家	臨床症狀	防護措施
新冠併發重症	全球	發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常、不明原因之腹瀉。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩(或視情況 N95 口罩) ■ 防水隔離衣
新型 A 型流感	全球、中國	急性呼吸道感染、高燒(≥38°C)、咳嗽、臨床、放射線診斷或病理學上顯示肺部實質疾病，具有動物或農場/活禽市場暴露史。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 負壓病室
小兒麻痺	全球、剛果民主共和國、巴基斯坦、坦尚尼亞	發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐、不對稱無力麻痺、無菌性腦膜炎	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離
立百病毒感染症	印度	腦病變(意識改變 ≥ 24 小時或人格改變)或運動失調，發燒(體溫≥38°C)、抽搐、局部神經症狀、腦脊髓液異常、異常腦波 EEG、腦部影像學檢查異常，有流行地區旅遊史、動物接觸史	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 外科口罩 ■ 隔離衣 ■ 單人病室
腸病毒	新加坡、越南、韓國	泡疹性咽峽炎、手足口、病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎、流行性肌肋痛、急性淋巴結性咽炎。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

漢他病毒症候群	阿根廷	發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、低血壓後期出現休克、呼吸衰竭	■ 手部衛生
屈公病	古巴	突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛，約半數皮疹，症狀持續3~7天。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
萊姆病	德國	臨床症狀包括在皮膚組織、循環系統、神經系統及肌肉骨骼系統出現的異常症狀。感染初期症狀類似感冒，會有頭痛、發燒、全身疲勞、寒顫、噁心、嘔吐、頭部僵硬、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等症狀	■ 手部衛生
登革熱	柬埔寨、秘魯、斯里蘭卡	高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。	■ 手部衛生 ■ 發燒日起五天內使用蚊帳
M 痘	泰國、馬達加斯加、西班牙	發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、皮疹。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 防水隔離衣 ■ 單人病室
麻疹	美國、墨西哥、哈薩克、印尼、智利、	突然發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、柯氏斑點、斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面。	■ 手部衛生 ■ N95 口罩 ■ 負壓病室
流感	美國、香港	發燒、咳嗽、呼吸短促、肺炎	■ 手部衛生 ■ 外科口罩
克里米亞-剛果出血熱	印度	發燒、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、皮膚瘀點。	■ 手部衛生 ■ 接觸隔離

發熱伴血小板減少綜合症 (SFTS)	日本	發燒、血小板及白血球減少，噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大，出血傾向；肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 單人病室 <input type="checkbox"/> 接觸隔離
沙門氏菌感染症	美國	一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約 6-48 小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀	<input type="checkbox"/> 手部衛生
傷寒	印度	發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹、咳嗽、便秘或腹瀉、淋巴腫大	<input type="checkbox"/> 手部衛生 <input type="checkbox"/> 接觸隔離